



PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

N 32

32% CAŁKOWITEGO AZOTU (N)

8,0% azotu azotanowego 8,0% azotu amonowego 16,0% azotu amidowego

Składniki produktu: CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2), Mocznik (CAS 57-13-6)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawóz uniwersalny w postaci wodnego roztworu do zastosowania przedsiewnego i pogłównego, więcej informacji na www.nawozy.eu.

Orientacyjne dawki nawozu RSM® 32 w l/ha i kg/ha

ROŚLINA	Potrzeby nawożenia azotem						
	bardzo małe i małe		średnie		duże i bardzo duże		
	l/ha	kg/ha	l/ha	kg/ha	l/ha	kg/ha	
Pszonka ozima	261-308	344-406	332-379	438-500	403-427	531-563	
Zboża jare	pszenica jara	213-237	281-313	261-308	344-406	332-379	438-500
	jęczmień jary	95-142	125-188	166-213	219-281	237-261	313-344
Rzepak ozimy	332-355	438-469	379-403	500-531	427-474	563-625	
Kukurydza	261-308	344-406	332-379	438-500	403-427	531-563	
Burak cukrowy*	190-237	250-313	261-308	344-406	332-403	438-531	
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*	237-284	313-375	308-332	406-438	355-403	469-531	
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*	190-237	250-313	261-308	344-406	332-355	438-469	

* bez obornika


Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.

Stosować na zdrowe, suche rośliny, o dobrym turgorze. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna przekraczać 20 °C, a względna wilgotność powietrza powinna wynosić powyżej 60%, nawożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne. Stosować oprysk grubokroplisty lub węże rozlewowe.

Nawóz przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.

W celu uzyskania szczegółowych zaleceń prosimy o kontakt z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. lub z agro@grupazoty.com.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW



W czasie magazynowania nie następuje utrata wartości odżywczych nawozu. Wodę, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania, należy uzupełnić do stanu pierwotnego.

Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

UWAGA

H319: Działa drażniąco na oczy.

P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

UFI: WKQH-Q5VG-DMPF-TSOW



Producent:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
tel.: +48 81 565 27 39, rsm@grupazoty.com, www.nawozy.eu

masa netto:
1320 kg / 1000 L